G.

goubot
ch au Cap St Domingue

hernie complette

Memoire addressée à monsieur Louis ancien secretaire pour les correspondances premier chirurgien de monseigneur le dauphin demonstrateur royal membres des academies de Lyon et de Stockolm

pour l'Academie de chirurgie

Jay recu chez moy le vingt aoust mil sept cent soixante et sept, un negre de la coste d'angol de l'age, à peu pres et selon son raport de 30 à 35 ans nommé Louis baptisé dans l'eglise de la ville du cap, ou il reside depuis 18 ans, qu'il à eté ammené de son pays, et vendu à divers maitres, appartenans à present au sieur Sicard fermier des boucheries du cap- pour luy visiter une tumeur qui m'a parue extraordinaire que j'ay prié plusieurs maitres chirurgiens du cap- mes confreres d'avoir la bonté conjointement avec moy de l'examiner, ce qu'ils ont faits. un efforts qu'il fit à neuf à dix ans luy à occasionné une petite tumeur dans l'aine gauche qui a rentré et sorty pendant environt y a 18 ans ensuite de ce temps cette tumeur inguinale n'est plus rentrée, jusqu'à aujourdhuit et a toujours été en augmentant depuis environ 10 ans, n'ayant point eu de bandage et faisant le mettier de battelier, lequel ne s'execute qu'avec beaucoups d'efforts. cette tumeur prend son origine proche l'anneau du muscle oblique externe gauche et se termine au condyle interne du femur.

ARC 16 d 4 n° 121

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

elle pése auen de pays environ 20 à 25 ᵗᵗ, sa figure —
approche à celle d'un melon d'eau ou d'un oeuf.
sa consistance est mol au tact et assé égalle son pédicule
est bien plus considerable que celuy du fruit dont je parle.
L'anneau paroit dilatté s'éxervant un pouce de diametre et
comme formant un bord aponeurotique tres dure
sur toute la tumeur rampe tous les vaisseaux du scrotum
Lesquels sont tres variqueux et forment comme plusieurs sceps
de vignes.
Le testicule gauche est confondüe dans un sarcocéle qu'il forme,
les vaisseaux spermatiques du même costé sont éxtrémement
dillatez.
Le testicule droit est plus bas qu'il ne doit estre et situé
ala partie posterieure, et un peu lateralle dela tumeur,
il est tres sein ainsy que ses vaisseaux
La verge se prolonge depuis sa racine jusqu'à un quart dela
tumeur, le Longt de sa partie esterne droite depuis le
gland, jusqu'à L'orifice de L'urine ou meat urinaire
le prépuce se continue jusqu'ala partie moyenne éxterne
toutes ces choses me font caracteriser quatre maladies —
particulieres qui forme cette masse ou tumeur.
La premiere est éntero-epyplo-mésenterique puisque je
sens par la molesse de la tumeur des ondulations —
intestinales. que je vois les mouvements tant antiperistabliques
que péristabliques, qu'on entend des borborigmes et que le
ventre inferieure paroit ne plus contenir en quelque
façon, que le rectum et les autres viceres contenués
dans cette capacité.
La seconde est la dilatation des vaisseaux spermatiques
du meme coste appellé Circocele.
Le sarcocéle que forme le testicule gauche est formée
de chaires dures et fongueuses,
La troisieme est le varicocele qui est la dilatation
des veines du scrotume.
ainsy voila par cette raison une tumeur faitte
de partie et d'humeur.

qui Compliquée d'entéro-epiplo-mesenterique, Cerçocelle,
Sarçocéle et uariçocele.
à L'égard des proportions de cette tumeur.
sa basse ou pedicule à de Longueur trois pouces et demye
La tumeur à de Longueur non compris son pedicule
14 pouçes et demye cequi fait tout compris depuis La
partie superieure du pedicule, jusqu'a la partie inferieure
de la tumeur 18 pouces.
La verge à de Longueur non compris le prépuce qui
se prolonge le long de la face externe et un peu
anterieure a la tumeur du costé droit 4 pouces.
le prépuce à de Longueur pris depuis le gland, jusqu'a
L'orifice de L'urine 5 pouce et demye, cequi fait tout
comprit depuis la Racine de La verge, jusqu'au bout
du canal ou méat urinaire de Longueur 9 pouçes et
demye.
La basse ou pedicule à de circonference 14 pouce,
La partie moyenne à de circonference 22 pouce et
demye, La partie inferieure à de circonference
18 pouces.
il ya 18 ans apresent qu'est le principe de cette tumeur
La quelle forme actuellement selon moy un second
ventre inferieure, par L'enormité du sac herniair et
du scrotum lesqu'elle contiennent au moins les
trois quarts des intestins, tant les grêles que les gros
et par cette Raison La plus grande partie du
mesentere.
malgré cela monsieur cette énorme hernie complette et
compostte ne luy empesse pas des fonctions naturelles,
il est d'ailleur sy habitué à cela que depuis ce temps
il n'a porté, jusqu'à present aucun bandage herniaire,
et malgré cela pourroit a moins de maladie, soient accidentel
ou autrement vivre encorre autant, sy cependant il
arrivoit qu'on ne le sacrifia ou à d'autre de mes confreres
ou enfin qu'il vint a mourir par quelque mort prompte
je ne manqueroit pas monsieur de vous faire part
des suittes

Goubot m.e en chirurgie au
Cap, isle St. domingue

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

~~47~~ N° 90